

Aprikosensorten

Sorte	Blütezeit	Reifewoche	Wuchs	Anfälligkeit	Ertrag	Frucht	Sonstiges
Orangered[®] 'Bhart'	sehr früh	Anfang bis Mitte Juli	sehr stark	moniliaanfällig, scharkatolerant	mittelhoch, verzögerte Ertrags- bildung	groß, leuchtend orangerot, saftig, aromatisch, glatt- schalig	selbststeril – Befruchter: Harogem, Harlayne, Fantasme, Bergeron, Hargrand, Goldrich
Goldrich[®] 'Sungiant'		Mitte Juli	sehr stark	gering	früh, hoch und regelmäßig	sehr groß, transportfest, guter Geschmack, ideal für den Frischmarkt	sehr reich blühend, teilweise selbstfrucht- bar – Befruchter: Aurora, Rouge de Fournes, Hargrand, Pinkcot
Hargrand	früh	Mitte bis Ende Juli	mittelstark	robuste Sorte, wenig empfindlich gegen Fäule	gut	sehr groß, orange gefärbt, gut steinlösend, guter Geschmack	teilweise selbstfruchtbar – Befruchter: Fantasme, Orangered
Harlayne	extrem spät blühend	Ende Juli bis Anfang August	mittelstark bis stark	keine Moniliaanfälligkeit, scharkatolerant	äußerst reich tragend	mittelgroß, leuchtend orange- rot	selbstfruchtbar
Ungarische Beste	mittelfrüh	Anfang August	mittelstark	wenig krankheits- empfindlich	später Ertrags- beginn, unregel- mäßig,		Selektionen verwenden, ideal für Brennzwecke
Bergeron	extrem spät blühend	Mitte August	mittelstark	bakterieller Krebs	hoch, reich und regelmäßig	groß, orange gefärbt, Sonnenseite gerötet	ungleichmäßig reifend, Frucht vielseitig verwendbar
Aurora[®]	mittelfrüh	Ende Juni bis Anfang Juli	stark		sehr früh und hoch	mittelgroß, orange gefärbt, guter Geschmack, säuerlich	selbststeril – Befruchter: Goldrich, Pinkcot, Silvercot, Rouge de Fournes, Hargrand
Harogem		Ende Juli bis Anfang August	stark	wenig empfindlich gegen Fäule	hoch, regelmäßig	fester, guter Geschmack, transportfest, leuchtend rubinrot - orange	selbstfruchtbar, gute Winter- und Blüten- frostfestigkeit
Tardicot[®]		Anfang bis Mitte August				oval, orangerot, festfleischig	gute Lagerfähigkeit
Pinkcot[®] 'Cotpy'	mittelspät	Anfang – Mitte Juli	stark	nicht Alternanz anfällig		leuchtend orange, kräftige rote Backe, fein würzig im Geschmack	sehr lang – reich blühend, teilweise selbstfruchtbar
Kioto[®]	mittelspät	Mitte Juli bis Anfang August			früh, hoch, regelmäßig	mittelgroß, festfleischig, leuchtend orange, Sonnenseite rot gefärbt, guter Geschmack	selbstfruchtbar
Kuresia[®]			mittelstark	scharkatolerant		mittelgroß, orange-rote Früchte, guter Geschmack	gute Transport- und Lagerfähigkeit, selbstfruchtbar, reich blühend
Bergarouge[®] 'Avirine'		Mitte Juli bis Anfang August	stark			groß, leuchtend orange, rote Backe, guter Geschmack	teilweise selbstfruchtbar
Silvercot[®] 'Versyl'		Anfang – Mitte Juli	mittelstark breit		hohe Erträge	leuchtend orange, kräftige rote Backe, fein würzig im Geschmack	viel Arbeit beim Ausdünnen

Unterlagen


Unterlage	Boden	Standort	Wurzel	Wuchs	Anfälligkeit	Sonstiges
Marillensämling (P.armeniaca L.)	tiefgründig, durchlässig	warm, trocken	wachsen Steil hinunter	stark	arteigene Sämlinge zeigen gute Affinität zu den Edelsorten, sind jedoch verticilllose (Welkekrankheit) und wurzelschimmelanfällig	für die Heranzucht großer Bäume geeignet
St. Julien Inra GF 655-2	mittelschwer, lehmig		Wurzelausläufer	mittelstark	wenig virusanfällig	begünstigt flachere Aststellungen, Blüte verzögert, fördert Schwachwüchsigkeit, frühe Erträge, mittlere Forstempfindlichkeit
Torinel® 'Avifel'			wenige, aber bedornete Wurzelausläufer	schwächer als GF 655-2	widerstandsfähig gegen Wurzelersticken	für moderne Spindel- und Heckenerziehung, gute Verträglichkeit mit allen Aprikosensorten – unverträglich mit vielen Pfirsich- und Nektarinensorten, früh im Ertrag,
Rubira®	leicht - mittelschwer	trocken	wurzeln tiefer als 655-2	stark		Heckenerziehung
Wavit® 'Prudom'		trocken	keine Wurzelausläufer	schwach	widerstandsfähig gegen Chlorose und Wurzelersticken, gute Affinität mit allen Aprikosensorten	frühe, hohe Erträge, klimatische Robustheit, hohe Frostfestigkeit
29/C		trocken – feucht	wenige Wurzelausläufer	sehr homogen	gute Widerstandsfähigkeit gegen Agrobakterium (Wurzelkropf), Verticillium, Nematoden	

Quelle:

- Lucas` Anleitung zum Obstbau 32. Auflage, Verlag Eugen Ulmer
- Sorten- und Unterlagenbeschreibung Obstbaumschule Schreiber

Bitte Beachten: Die vorliegenden Informationen sind sorgfältig recherchiert worden und stammen aus den angegebenen Quellen. Die **webfruit** GmbH übernimmt keine Haftung für den vorliegenden Inhalt.

Wuchsstärke verschiedener Aprikosenunterlagen:



© by webfruit GmbH

Quelle: Sorten- und Unterlagenbeschreibung Obstbaumschule Schreiber